

## Ziekte van Glässer

### Verschijselen

De ziekte van Glässer heeft diverse verschijningsvormen. Verwarring met andere ziekten is gemakkelijk mogelijk. Acute infecties gaan gepaard met hoge koorts, sloomheid, gebrek aan eetlust, hoest, gezwollen gewrichten, kreupelheid, pijn bij oppakken en hersenverschijnselen. Ook kan plotselinge sterfte optreden. Na een acute infectie blijven de biggen vaak achter in de groei of gaan slijten als gevolg van ontstekingen aan longen, borst- en buikvlieszen, hartzakje en gewrichten.

### Oorzaak

De ziekte wordt veroorzaakt door de bacterie *Haemophilus parasuis*, die op nagenoeg alle varkensbedrijven aanwezig is. Er zijn vele typen en subtypen van de bacterie bekend, die variëren van min of meer goedaardig tot kwaadaardig. Als gevolg van stressmomenten en weerstandsvermindering door andere kiemen kan de ziekte zich openbaren.

### Besmettingsroute

De biggen worden meestal vlak na de geboorte besmet door de zeug. De besmetting blijft in eerste instantie beperkt tot de neus- en keelholte van de big, waar hij gewoonlijk geen klachten veroorzaakt. Als gevolg van bepaalde omstandigheden kan de kiem via het bloed verspreid worden naar diverse organen, waarna ziekteverschijnselen ontstaan.

### Schade

Soms blijft de infectie beperkt tot één of meerder biggen uit één toom. Soms zijn hele tomen aangetast. Aangetaste biggen sterven, blijven achter in de groei of kwijnen weg.

## Diagnose van ziekte van Glässer

Aan de hand van de verschijnselen

Via sectie.

## Risicofactoren van ziekte van Glässer

Onvoldoende biest- en melkopname.

Stress, als gevolg van veelvuldig mengen van tomen zowel voor als na het spenen, te vroeg spenen, transport, slecht klimaat, te koud, slechte hygiëne, overbezetting enz.

Aankoop van fokmateriaal met een "nieuw" type.

Andere ziekten waarvoor het varken ook goede afweer nodig heeft om te kunnen herstellen zoals PCV2, PRRS en andere.

## Aanpak van ziekte van Glässer

### Preventie

Vermijden van bovengenoemde risicofactoren.

Er is een vaccin beschikbaar voor biggen

### Dieren met de ziekte van Glässer

De bacterie is goed gevoelig voor de meest gebruikte antibiotica. Zieke biggen moeten meerdere dagen worden behandeld met een hoge dosering antibiotica per injectie.