

Moerbeihartziekte

Verschijnselen

Moerbeihartziekte gaat meestal gepaard met acute sterfte onder de snelst groeiende gespeende biggen. Een enkele keer komt de aandoening reeds voor bij de oudste zuigende biggen en bij pas opgelegde vleesvarkens. Soms worden bleke biggen met rode vlekken gezien met een snelle ademhaling

Oorzaak

Meestal wordt als oorzaak een tekort aan vitamine E en selenium genoemd. Daarnaast kan het ziektebeeld ook worden veroorzaakt door E.coli gifstoffen en Streptococcon bacteriën. Hoogstwaarschijnlijk speelt de snelle groei ook een rol.

Besmettingsroute

Vaak is er geen sprake van een besmettingsroute. Ingeval van een Streptococcon of een E.coli infectie: Zie desbetreffende ziekten (speendiarree, slingerziekte, Streptococcon infectie)

Schade

Het betreft meestal één tot meerdere biggen. Soms is er sprake van een bedrijfsprobleem. De schade treedt op als gevolg van verhoogde uitval.

Diagnose van moerbeihartziekte

Aan de hand van de verschijnselen en via sectie.

Risicofactoren van moerbeihartziekte

Het voeren van voeders met een te laag vitamine E en / of selenium gehalte. Daarnaast speelt stress een nadelige rol.

Aanpak van moerbeihartziekte

Preventie

Zorgen voor voeders met voldoende vitamine E en selenium. Daarnaast de stress rond het spenen beperken (huisvesting, ventilatie, omgevingstemperatuur, hokbezetting e.d.). Zie ook onder: Preventieve maatregelen t.a.v. het voorkomen van speendiarree, slingerziekte, en Streptococcon infectie

Dieren met moerbeihartziekte

behandelen is niet mogelijk.