

De ziekte pokken (voor smeerpokken, een bacteriële infectie, zie smeerwrag)

Verschijselen

Pokken kunnen af en toe worden gezien bij varkens. Als het virus voor het eerst een bedrijf binnenkomt, kunnen varkens van alle leeftijden verschijnselen vertonen. Op bedrijven, waar het virus aanwezig is, komt de aandoening voor bij biggen van 6-12 weken oud. Soms worden biggen geboren met pokken.

Oorzaak

Pokken wordt veroorzaakt een virus. Het virus wordt vaak overgebracht door stekende insecten, vooral luizen.

Besmettingsroute

Via stekende insecten, vooral luizen

Schade

Meestal is er sprake van weinig schade.

Diagnose van pokken

De ziekte begint met rode vlekjes, die later overgaan in bultjes met een ronde rode rand. De bultjes, gevuld met een helder vocht, breken door, waarna er zwarte korsten ontstaan. Aangetaste dieren kunnen koorts hebben en minder vreten. De ziekte duur is vaak vrij lang, variërend van 3 – 5 weken. Het sterftepercentage is meestal verwaarloosbaar klein.

Risicofactoren van pokken

Aankopen van besmette varkens en de aanwezigheid van luizen of andere stekende insecten. Hygiëne speelt een belangrijke rol.

Aanpak van pokken

Preventie

Luizen en insectenbestrijding.

Dieren met pokken

Een behandeling is niet mogelijk. Eventuele secundaire infecties behandelen en zorgen voor een droge en schone omgeving. Dieren met pokken moeten warm en droog kunnen liggen. Zieke dieren moeten worden behandeld per injectie. Bij ernstige uitbraken kan preventief worden gemedicineerd via voer of drinkwater.